

Siderblut Complex

Hierro polimaltosato / Ácido fólico /
Cianocobalamina

Vía oral

Comprimidos recubiertos

Industria Argentina | Venta bajo receta

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene **Hierro elemental** (como polimaltosato) 100 mg; **Ácido fólico** 0,5 mg; **Cianocobalamina** 0,2 mg. Excipientes: Lactosa monohidrato; Celulosa polvo; Croscarmelosa sódica; Dióxido de silicio coloidal; Estearato de magnesio; Talco; Alcohol polivinílico; Dióxido de titanio; Polietilenglicol 3000; Amarillo ocaso laca aluminica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antianémico.

INDICACIONES

Siderblut Complex está indicado en el tratamiento y prevención de la anemia por déficit combinado de Hierro y Ácido fólico.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

El Hierro es un elemento esencial para la síntesis fisiológica de la hemoglobina y es necesario para una adecuada eritropoyesis y el consecuente transporte de oxígeno. Actúa como cofactor de diversas enzimas que incluyen el sistema citocromo y también interviene en el metabolismo de las catecolaminas y en la actividad de los neutrófilos. El Ácido fólico y la Cianocobalamina intervienen en la maduración de los glóbulos rojos.

Farmacocinética: La absorción de Hierro está aumentada cuando los depósitos están deplecionados y se realiza, preferentemente, a nivel del duodeno y del yeyuno. El Hierro polimaltosato es estable en medio ácido, no es afectado por los alimentos, se excreta por el intestino y mínimamente por vía urinaria. El Ácido fólico

se absorbe a nivel de todo el intestino delgado y se elimina principalmente por el riñón. La Cianocobalamina se absorbe en el íleon y la eliminación se hace a través del riñón.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Tratamiento de la anemia: Un comprimido dos veces por día. Prevención de la anemia: Un comprimido por día.

CONTRAINDICACIONES

Siderblut Complex está contraindicado en los casos de hipersensibilidad al Hierro o a alguno de los componentes de la formulación. Hemocromatosis, hemosiderosis, anemia hemolítica, insuficiencia hepática severa. Anemia perniciosa sin tratamiento parenteral correspondiente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Previamente al tratamiento debe realizarse el diagnóstico mediante el estudio de laboratorio correspondiente y, posteriormente controles hematológicos para evaluar la respuesta. Debe descartarse un déficit en vitamina B12, caso contrario debe implementarse el tratamiento parenteral usual, debido a que un aporte de Ácido fólico puede agravar los síntomas neurológicos. Durante la administración oral de sales de hierro se puede producir el oscurecimiento de las heces, lo que no tiene significación patológica. Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera péptica o de enfermedades inflamatorias intestinales.

Embarazo: Hasta el momento no se han reportado efectos adversos en el feto. El médico decidirá la indicación de este medicamento.

Lactancia: No se han comunicado problemas derivados de la administración de las dosis terapéuticas recomendadas.

Uso pediátrico: Este medicamento no es adecuado para su utilización en niños.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Las sales de hierro pueden afectar la absorción de fármacos como el etidronato y las fluoroquinolonas. Los antiácidos, el calcio y los oxalatos pueden disminuir la absorción del Hierro. Por esta razón, cuando sea necesario el aporte de alguno de ellos debe dejarse un intervalo de dos horas entre su administración y la de **Siderblut Complex**. Hierro: penicilamina, tetraciclinas. Alimentos y bebidas: Con elevado contenido de fitatos (ciertas legumbres), fosfatos (ej.: Huevo), taninos (té, café), pueden disminuir la absorción de hierro. Ácido fólico: Antiepilépticos, ácido acetilsalicílico, sulfamidas, colestiramina. Antagonistas de folatos (ej.: Trimetoprima, pirimetamina, metotrexato).

REACCIONES ADVERSAS

La administración de las dosis recomendadas es bien tolerada, raramente pueden presentarse dolor o calambres abdominales. Con menos frecuencia se han registrado estreñimiento o diarrea, náuseas, vómitos. Heces oscuras. Excepcionalmente reacción de hipersensibilidad.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosis los primeros síntomas que cabría esperar son: Diarrea, a veces con sangre, fiebre, náuseas, dolores o calambres abdominales, vómitos. Más tardíamente pueden aparecer somnolencia, cansancio, palidez, coloración azulada de los labios. Los síntomas de una intoxicación pueden ponerse en evidencia de manera tardía. Se han comunicado casos fatales, sobre todo en niños menores de 6 años. Las medidas a tomar, de acuerdo a lo clínico, consisten en eméticos, líquidos y electrolitos endovenosos, tratamiento sintomático. En las intoxicaciones severas puede emplearse la deferoxamina que actúa como quelante y facilita la eliminación de hierro.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247, Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIONES

Siderblut Complex Comprimidos recubiertos: Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C

Mantener en su envase original hasta su utilización.

Elaborado en José E. Rodó 6424, C1440AKJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirección Técnica: María Eugenia Belgiorio - Farmacéutica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado n°: 51.974

Siegfried S.A. Carlos Calvo 2756, C1230AAT, C.A.B.A.

Información a profesionales y usuarios:

0810-333-5431

www.siegfried.com.ar

Fecha de última revisión: Enero 2005



3075804840 AS0003 0522 35

