

# ALUMPAK

## COLORURO DE ALUMINIO HEXAHIDRATADO

### Uso externo

Loción

#### FORMULA

Cada 100 ml de loción contiene *Cloruro de aluminio hexahidratado* 20 g. Excipientes: Alcohol etílico.

#### ACCION TERAPEUTICA

Anhidrótico.

#### POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Humedecer un hisopo de algodón con **ALUMPAK** loción, y aplicar sobre el área afectada una vez al día, por la noche, al acostarse.

Para prevenir una irritación, el área afectada debe estar perfectamente seca antes de aplicar el producto. Para lograr un máximo efecto, el médico puede indicar cubrir el área tratada con un film de celofán, mantenido en su lugar con ayuda de una media, guante o prenda de algodón. No adherirlo con cintas adhesivas.

Lavar el área tratada a la mañana siguiente. La excesiva transpiración será detenida después de la primera o segunda aplicación, pero conviene aplicar durante una semana.

Mantener el efecto aplicando el producto una o dos veces por semana, o según se presente la necesidad.

#### CONTRAINDICACIONES

Pacientes sensibles a las sales de aluminio.

#### ADVERTENCIAS AL PACIENTE

**ALUMPAK** loción, es un producto para uso externo. No aplicar sobre membranas sensibles, boca, ojos, etc.; ni sobre la piel con irritaciones, escamosis o heridas. Si se ha rasurado o depilado anteriormente el área a tratar, dejar pasar 24 horas antes de aplicar **ALUMPAK** loción.

En caso de producir reacciones cutáneas, suspender el tratamiento.

El contacto directo con la ropa puede perjudicar las telas.

Luego de usar, mantener el envase bien cerrado para prevenir la evaporación del producto.

#### SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / 4962-2247. Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777.

## PRESENTACION

**ALUMPAK** loción: Envase conteniendo 30 ml.

**CONSERVAR ENTRE 5 Y 35° C.**

***MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.***

**CONTIENE ALCOHOL, MANTENER ALEJADO DEL FUEGO**

Industria Argentina.

**Venta bajo receta.**

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 39.347.

Directora Técnica: Viviana Silvia Rivas, Farmacéutica y Bioquímica.

Elaborado en Arengreen N° 830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Agosto de 1991.

**Investi Farma S.A.**

Lisandro de la Torre 2160, C1440ECW Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 **Información al Consumidor 4346-9910**

**INVESTI**  
CUERPO Y ALMA

B. 1205202841  
IN0065-0709 (16)

