

CICATREX BABY

OXIDO DE ZINC / ACEITE DE HIGADO DE BACALAO



Pomada

FÓRMULA

Cada 100 g contiene *Óxido de zinc* 40,0 g; *Aceite de hígado de bacalao* 6,0 g. Excipientes: Butilhidroxianisól; Lanolina anhidra; Metilparabeno; Vaselina blanca; Talco; Agua destilada.

INDICACIONES

CICATREX BABY Pomada está indicado en dermatitis de la zona del pañal, escoriaciones leves y quemaduras leves.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Astringente (Tópico).

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: Cutánea (Piel).

Tratamiento:

En caso de rozaduras, o al primer signo visible de enrojecimiento, escoriación o irritación, aplicar CICATREX BABY de tres a cuatro veces por día, o bien en cada cambio de pañal según se requiera.

Prevencción:

Para prevenir rozaduras, aplicar una ligera capa de CICATREX BABY en cada cambio de pañal principalmente antes de dormir (cuando el contacto con la humedad es prolongado).

Además de sus cualidades protectoras el Óxido de zinc actúa como astringente que promueve alivio de irritaciones e inflamaciones locales, al disminuir el flujo de la mucosa y de otras secreciones.

Las propiedades de CICATREX BABY pueden resumirse en:

Protección: Capacidad para crear una barrera en la superficie de la piel donde se aplica, reduciendo los efectos de agentes irritantes, aliviando el dolor, ardor e irritación que éstos producen.

Prevencción: La naturaleza bacteriostática de la formulación inhibe el desarrollo de microorganismos.

Curación: Acción cicatrizante y regenerativa de la piel por lo que contribuye a promover una rápida y efectiva curación. El Aceite de hígado de bacalao por su contenido natural de vitaminas A y D ayuda a la regeneración de la piel.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso externo solamente.

Si la condición empeora o no hay cambios dentro de los 7 días, consulte a su médico.

Evitar el contacto con los ojos.

Sensibilidad cruzada: Hasta la fecha no se han presentado.

Carcinogénesis: No se han reportado estudios adecuados y bien controlados en humanos.

Mutagénesis: No se han reportado estudios adecuados y bien controlados en humanos.

Fertilidad: No se han reportado estudios adecuados y bien controlados en humanos.

Embarazo: No se han realizado estudios adecuados y bien controlados con Óxido de zinc en pacientes embarazadas.

Geriatría: No se han realizado estudios adecuados y bien controlados con Óxido de zinc en pacientes geriátricos.

Interacciones con medicamentos y/o problemas asociados:

Hasta la fecha no se ha presentado reacción alguna.

SOBREDOSIFICACIÓN

Recomendaciones en caso de ingestión accidental o en contacto con los ojos:

1. **Ingestión:** En caso de ingestión, puede causar náusea o vómito. Se recomienda inducir al vómito. Beber agua para diluir el producto.

2. **Contacto con los ojos:** En caso de contacto accidental con los ojos, puede producir irritación menor. Se recomienda enjuagar con agua tibia durante 15 a 20 minutos, hasta que no quede evidencia del producto en los ojos. Consulte a su médico si la irritación ocular persiste.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / 2247. Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN

CICATREX BABY Pomada: Envase conteniendo 50 g.

Pomada grasa de color blanco tiza.

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO
Y/O A SU FARMACÉUTICO.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**MANTENER A TEMPERATURA AMBIENTE
ENTRE 15° Y 30°C.**

Industria Argentina.

Venta libre.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.829.

Directora Técnica: Viviana Silvia Rivas, Farmacéutica y
Bioquímica.

Elaborado en Av. Intendente Amaro Avalos 4208, Munro,
Provincia de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Mayo de 2003.

Investi Farma S.A., Lisandro de la Torre 2160, C1440ECW
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 **Información al consumidor 4346-9910 / 0810-333-5431.**

INVESTI

B 1277301841
IN1416 0615

7