

MAILEN

METRONIDAZOL / MICONAZOL / CENTELLA ASIÁTICA / POLIMIXINA / NEOMICINA

Cápsulas blandas vaginales

FORMULA

Cada cápsula blanda vaginal contiene **Metronidazol** 400 mg; **Nitrato de miconazol** 100 mg; **Centella asiática** 15 mg; **Sulfato de polimixina** 5 mg; **Sulfato de neomicina** 45 mg. Excipientes: Vaselina líquida; Vaselina sólida.

ACCION TERAPEUTICA

MAILEN es una asociación destinada al tratamiento de las infecciones vaginales.

INDICACIONES

Tratamiento local de las micosis vulvovaginales, vaginitis por tricomonas y vaginitis inespecíficas en las que se presume sobreinfección con gérmenes sensibles a la Neomicina y la Polimixina.

ACCION FARMACOLOGICA

Por su composición **MAILEN** tiene actividad antimicótica, antibacteriana y antitricomoniásica. También posee efectos tróficos que favorecen la recuperación del epitelio vaginal.

Microbiología:

Por su composición **MAILEN** tiene actividad sobre protozoarios como tricomonas, sobre bacterias como las *Gardnerella vaginalis*, *Campilobacter*, gérmenes Gram positivos y Gram negativos, y sobre hongos, especialmente del género *Candida*.

Farmacocinética:

Luego de la administración por vía vaginal la absorción es insignificante por lo que los niveles plasmáticos son muy bajos.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Adultos: Una cápsula colocada por vía vaginal profunda, por la noche al acostarse, durante 6 a 12 días.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. Si bien la absorción por esta vía no es significativa, no se aconseja su administración durante el primer trimestre del embarazo.

ADVERTENCIAS

Es conveniente evitar la ingestión de bebidas alcohólicas durante el tratamiento. La administración de este medicamento no protege del contagio de enfermedades de transmisión sexual.

PRECAUCIONES

Administrar con precaución en pacientes con enfermedades activas del sistema nervioso central, con enfermedades hematológicas o con insuficiencia hepática grave. **Embarazo:** No debe administrarse durante el primer trimestre, posteriormente el médico deberá evaluar los beneficios y riesgos potenciales de su empleo. **Lactancia:** Si bien la absorción es muy baja, su administración queda a criterio del médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso concurrente con anticoagulantes orales como la warfarina o los dicumarínicos puede provocar aumento del tiempo de protrombina y tendencia al sangrado. El consumo de alcohol durante el tratamiento puede ocasionar vómitos, sudoración, hipotensión (efecto antabus).

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas son de tipo local: Sensación de ardor o de irritación, prurito.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247, Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACION

MAILEN Cápsulas blandas vaginales:
Envases conteniendo 6 y 12 cápsulas vaginales.



Cápsulas blandas ovales, color rosado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA
INFERIOR A 30°C

Industria Argentina.

Venta bajo receta.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 50.904.

Directora Técnica: Viviana S. Rivas,
Farmacéutica y Bioquímica.

Elaborado en Av. Márquez 654/91,

Villa Loma Hermosa, Pcia. de Buenos Aires.

Envasado en Alvaro Barros 1113,

B1838CMC Luis Guillón, Pcia. de Buenos Aires.

Fecha de última actualización: Junio de 2003.

Investi Farma S.A.

Lisandro de la Torre 2160,
C1440ECW Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Información al Consumidor
4346-9910 / 0810-333-5431

INVESTI

B 129810184Z
INT1951 0817

25/L114