

# Micomazol

## Clotrimazol

Uso externo

Crema dérmica - Pasta

Industria Argentina | Venta bajo receta

### FÓRMULAS

**Micomazol** Crema: Cada 100 g contiene **Clotrimazol** 1 g; Alcohol bencílico; Glicerina; Monoestearato de etilenglicol; Propilenglicol; Monoestearato de sorbitán; Alcohol cetosteárilico; Vaselina; Trietanolamina; Agua purificada.

**Micomazol** Pasta: Cada 100 g contiene **Clotrimazol** 1 g ; Óxido de zinc; Talco ; Vaselina líquida ; Vaselina.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicótico de amplio espectro.

### INDICACIONES

El Clotrimazol tópico está indicado en el tratamiento de las candidiasis cutáneas producidas por *Candida albicans*.

Tinea corporis (tratamiento), tinea cruris (tratamiento), o Tinea pedis (tratamiento): El Clotrimazol tópico está indicado en el tratamiento de la Tinea corporis (culebrilla del cuerpo), Tinea cruris (culebrilla de la ingle, "prurito del jinete") y Tinea pedis (culebrilla del pie, pie de atleta) producidas por *Trichophyton rubrum*, *T. Mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum* y *Microsporum canis*.

Tinea versicolor (tratamiento): El Clotrimazol tópico está indicado en el tratamiento de la Tinea versicolor (Pityriasis versicolor, "hongo del sol") producida por *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*).

### POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

**Micomazol** crema y pasta: Aplicar sobre la zona afectada, extendiéndola con los dedos.

Renovar la aplicación cuando se ha removido por las ropas o por el pañal, hasta la desaparición total de las lesiones.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

### ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS

La tolerancia es muy buena, aunque en algunos pacientes sensibles pueden manifestarse reacciones locales, como irritación, quemazón, alergia o dermatitis.

## PRECAUCIONES

**Reproducción/embarazo:** No se han descrito problemas en humanos, incluso aunque se absorban sistémicamente cantidades pequeñas de Clotrimazol tópico.

**Lactancia:** No se han descrito problemas en humanos, incluso aunque se absorban sistémicamente cantidades pequeñas de Clotrimazol tópico.

**Pediatría:** No se dispone de información.

**Geriatría:** No se dispone de información.

## SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 4962-2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

## ADVERTENCIAS AL PACIENTE

Antes de utilizar, ver precauciones.

Evitar el contacto con los ojos.

No aplicar vendajes oclusivos sobre este medicamento, salvo que el médico lo indique.

Cumplir el ciclo de tratamiento completo.

## PRESENTACIONES

**Micomazol** Crema: Envases conteniendo 30 g.

**Micomazol** Pasta: Envases conteniendo 30 g.

## OTRAS PRESENTACIONES

**Micomazol** Polvo: Envases conteniendo 50 g.

**Micomazol** Deo aerosol: Envases conteniendo 110 g.

*Mantener fuera del alcance de los niños.*

*Conservar entre 15°C y 30°C.*

*Mantener en su envase original hasta su utilización.*

Elaborado en Av. Intendente Amaro Ávalos 4208, B1605ECT, Munro, Provincia de Buenos Aires.

Dirección Técnica: María Eugenia Belgiorno - Farmacéutica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 36.135.

**Siegfried S.A.** Carlos Calvo 2756, C1230AAT, C.A.B.A.

**Información a profesionales y usuarios: 0810-333-5431**

[www.siegfried.com.ar](http://www.siegfried.com.ar)

Fecha de última revisión: Junio 1982.



3018403840 AS0688 1122 3/L74

