

Tetralgin APC

Aspirina / Paracetamol / Cafeína

Vía oral

Comprimidos recubiertos

Industria Argentina | Venta libre

FÓRMULA

Cada comprimido recubierto contiene: **Aspirina** 250 mg; **Paracetamol** 250 mg; **Cafeína** 65 mg.

Excipientes: Almidón glicolato sódico; Povidona; Almidón pregelatinizado; Croscarmelosa sódica; Acido esteárico; Celulosa microcristalina; Hipromelosa; Lactosa monohidrato; Polietilenglicol 6000; Dióxido de titanio; Triacetina; Ciclamato de sodio; Amarillo ocazo laca aluminica 33%; Sacarina sódica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Analgésico, antifebril, antiinflamatorio.

USO DEL MEDICAMENTO

Lea detenidamente esta información.

Para el alivio temporario de los síntomas que acompañan al resfrío común tales como: cefaleas, fiebre, dolores musculares.

También está indicado para el alivio temporario de dolores de cabeza comunes y para aquellos provocados por ataques agudos de migraña diagnosticada (enfermedad que se manifiesta como dolor de cabeza de característica intenso, pulsátil que puede irradiarse a la sien, oreja, mandíbula o alrededor del ojo y puede acompañarse de náuseas, vómitos, lagrimeo y fotosensibilidad entre otros síntomas).

Como usar este medicamento

Esta presentación se administra por vía oral.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

Adultos y Niños mayores de 15 años: 2 comprimidos cada 6 horas, mientras persistan las molestias, sin exceder los 8 comprimidos en 24 horas, y/o como sea indicado por el médico.

Niños menores de 15 años: consultar al médico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal.

No se debe utilizar este medicamento en niños y adolescentes sin consultar a su médico. No administrar a menores de 15 años en caso de

síntomas de gripe o varicela ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar **síndrome de Reye**.

Consultar al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días, si se observan empeoramientos de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consultar al médico inmediatamente.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin

consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos. Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas consultar con su médico.

No usar este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos; en presencia de trastornos hemorrágicos; en presencia de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consultar con el médico. Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte con su médico. El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a los principios activos o a cualquiera de los componentes de la fórmula. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente.

El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No debe ser tomado con anticoagulantes, anticonvulsivantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides u otro antiinflamatorio. Si usted ingiere regularmente otro medicamento, consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

REACCIONES ADVERSAS

Por su contenido de aspirina, pueden observarse hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas. En niños, puede observarse el síndrome de Reye (ver ADVERTENCIAS). Por su contenido en paracetamol, puede observarse erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas),

náuseas, vómitos y malestar gástrico.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos recubiertos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30°C, en lugar seco.

Elaborado en José E. Rodó 6424, C1440AKJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirección Técnica: María Eugenia Belgiorno - Farmacéutica.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 47.502

Siegfried S.A. Carlos Calvo 2756, C1230AAT, C.A.B.A.

Información a profesionales y usuarios: 0810-333-5431

www.siegfried.com.ar

Fecha de última revisión: Enero 2008



3018001840 AS0515 0922 4/L77

